

CHEMISEPT G

NAHA ANTISEPTIKUM

CHEMISEPT G on värvitu efektiivne vahend naha antiseptikaks. Toode on laia fungitsiidse ja bakteritsiidse toimega, hävitab Gram-positiivseid ja Gram-negatiivseid baktereid (sh *Mycobacterium terrae*) ja seeni, desaktiveerib nii ümbrisega (sh HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex) kui ka ümbriseta viirusi (sh Adeno, Rota). Toote remanentne toime kestab 3 tundi.

Tootes **CHEMISEPT G** on kasutatud puhast ja vähelenduvat etüülalkoholi, vältimaks respiratoorsete allergooside teket. Peale naha antiseptikat jääb tänu tootes sisalduvale pikatoimelisele desinfektandile püsima kolmeks tunniks mikroobide elutegevuseks sobimatu keskkond. Toimeaja möödudes taastub kiiresti naha normaalne mikrofloora. Toote remanentne toime kestab 3 tundi.

Toode on värvitu ja sobib seetõttu kasutamiseks ka kosmeetiliste lõikuste korral.

KASUTAMINE:

Preoperatiivne naha ettevalmistus:

Operatsiooni piirkond töödelda **CHEMISEPT G** lahusega. Selleks kasutada korntange ja steriilset tampooni, mis immutada lahusega ja kanda nahale korralikult laiali hõõrudes. Operatsiooni piirkonna antiseptika viia läbi kaks korda, mõlemal korral toimeaeg 1,5 min. Intsisioonikile võib kleepida ainult kuivale nahale. Lahuse toimeaeg naha preoperatiivseks ettevalmistamiseks kokku 3 minutit.

Aseptilise operatsiooni korral alustada antiseptikat planeeritava löike piirkonnast, liikudes edasi perifeeria suunas.

Septilise operatsiooni korral alustada naha antiseptikaga perifeeriast, liikudes septilise piirkonna suunas.

Naha injektsiooni ja verevõtmise eelne antiseptika:

Pihustada **CHEMISEPT G** injektsiooni või verevõtmise piirkonnale, töödelda tampooniga, pihustada teistkordselt lastes lahusel kuivada. Toimeaeg 30 sekundit.

Intraartikulaarse injektsiooni, punktsiooni, artroskoopia ja kanüleerimise eelne naha antiseptika:

Pihustada operatsiooni piirkonnale, töödelda steriilse tampooniga ja korrata protseduuri. Lahuse toimeaeg naha ettevalmistamiseks kokku 3 minutit.

Mikrobioloogia:

Kasutatakse lahjendamata.

Toimeajad on toodud nii väherasuse kui rasuse naha korral.

Escherichia coli	lahjendamata	30 sek
Staphylococcus aureus	lahjendamata	30 sek
Pseudomonas aeruginosa	lahjendamata	30 sek
Streptococcus faecalis	lahjendamata	30 sek
Mycobacterium tuberculosis	lahjendamata	30 sek
Candida albicans	lahjendamata	30 sek
HBV	lahjendamata	30 sek
HIV	lahjendamata	30 sek
Adenoviirused	lahjendamata	30 sek
Herpes simplex	lahjendamata	30 sek.

Rota	lahjendamata	30 sek
Vaccina	lahjendamata	30 sek
BVDV	lahjendamata	30 sek

(surrogaarviirus HCV määramiseks)

Toode vastab prEN 12054, EN 14348, EN 12791 nõuetele.

Kuna **CHEMISEPT G** on läbinud testid BVDV (HCV surrogaat) ja vaccinia viirustele, inaktiveerib toode kõiki kapseldunud viiruseid. Nende katsetuste põhjal võib väita, et **CHEMISEPT G** on efektiivne ka nn. verega edasikanduvate viiruste suhtes nagu HBV, HCV ja HIV, samuti viirusgruppidele nagu orthomyxoviirused (kaasaarvatud influensaviirus, H5N1) ja herpesviirused (Herpes simplex virus).

ETTEVAATUSABINÕUD:

Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga!

Toode on väga tuleohtlik

Hoida eemal süttimisallikatest-Mitte suitsetada!

Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole

KOOSTIS:

etanool 75% (w/w), kvaternaarsed amooniumühendid 0,1% (toimeaine)

pH 6,5 - 7,5

Biotsiidi registreerimistunnistus nr 0045/05

PAKENDID:

- 75 ml pihustuspudel
- 100ml pihustuspudel
- 250ml pihustuspudel
- 250ml klappkorgiga pudel
- 500ml täitepakend
- 1 l täitepakend
- 5 l kanister