

IDARUTSIZUMAB (PRAXBIND, dabigatraani antidoot)

Näidustus	Spetsiifiline dabigatraani toimet blokeeriv ravim, mis on näidustatud Pradaxaga (dabigatraaneteksilat) ravitud täiskasvanud patsientidel, kui on vajalik dabigatraani hüübimisvastase toime kiire tühistamine: <ul style="list-style-type: none">• erakorralise operatsiooni / vältimatu protseduuri tegemise vajadusel;• eluohtliku või ravile allumatu verejooksu korral.
Annustamine	Soovitatav annus on 5 g (2 x 2,5 g/50 ml). Praxbindi veel ühe 5 g annuse manustamist võib kaaluda järgmistel juhtudel: <ul style="list-style-type: none">• kliiniliselt olulise veritsuse taasteke, millega kaasneb hüübimisaja pikenemine;• kui verejooksu kordumine võib olla eluohtlik ja kui täheldatakse pikenenud hüübimisajaga; või• kui patsient, kelle hüübimisaeg on pikenenud, vajab veel ühte erakorralist operatsiooni / kiireloomulist protseduuri. Asjakohased koagulatsiooniparameetrid on aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg (aPTT), lahjendatud trombiini aeg (dTT) või ekariini hüübimisaeg (ECT) Praxbindi ohutus ja efektiivsus < 18-a lastel ei ole veel tõestatud. Manustamisviis: Praxbind (2 x 2,5 g/50 ml) manustatakse i/v kas kahe 5- kuni 10-minutilise järjestikuse infusioonina või boolussüstina.
Vastunäidustused	Puuduvad
Kõrvaltoimed	Ei ole tuvastatud.