

AKTIIVSÜSI

Kasutamine	Paljude ainete imendumise takistamine (ravimid, mürgiseened ja -taimed jne.) Aktiivsüsi ei seo: alkohol, raud, liitium, happed, alused, fluor, kaalium, magneesium, petrooleum		
Annustamine		Ühekordse annusena	Korduva annusena
	Täiskasvanud	1g/kg; orienteeruvalt 50 – 100 g	15-30 g (0,25-0,5 g/kg) iga 2-4 h järel, keskmine annus 12,5 g/h
	Lapsed	0.5-1.0 g/kg	Keskmine annus 0.2 g/kg/h.
	Manustamine korduva annusena (võib olla kasu mürgistuste korral, mille puhul on tegemist aeglaselt elimineeruvate ainetega) Tavaline empiiriline ravi kestvus on 24-48h.		
Kasutamine rasedatel	Ei soovitata kasutada aktiivsütt kombinatsioonis sorbitooliga, kuna viimasest põhjustatud kõhulahtisus võib viia šoki või hüpovoleemia tekkele, mis omakorda avaldavad ebasoodsat toimet lootele.		
Vastunäidustused	Teadvushäired intubeerimata patsiendil (aspiratsioonioht). Patsient on manustanud söövitavaid aineid või aspiratsiooniohtu suurendavaid naftatooteid (aktiivsüsi ei seo antud aineid ja tõuseb risk rekurgitatsiooniks). Soole motoorikahäirete (iileus, subiileus) kahtlus		
Kõrvaltoimed	Iiveldus, oksendamine (eriti söe kiirel manustamisel), kõhukinnisus. Sooles võib moodustada ravimbesoaaire, mis võivad põhjustada soolesulgust. Silma sattudes on põhjustanud sarvkesta abrasiooni. Sorbitooli sisaldavad aktiivsöemikstuurid või aktiivsöe manustamine koos lahtistitega võib põhjustada kõhulahtisust, dehüdratatsiooni, hüpermagneseemiat ja hüpernatreemiat.		