

Videonüstagmograafia uuring

Teie uuring toimub kõrvakliinikus
J. Kuperjanovi 1, Tartu, ruumis 135

kp.....

kell

Videonüstagmograafia (VNG)

VNG on uuring, mida kasutatakse peapöörituse ja tasakaaluhäirete põhjuste selgitamiseks. Uuringu käigus pannakse Teile pähe spetsiaalsed prillid, mis on varustatud videokaameraga. Videokaamera jälgib silma liikumist. Uuringutulemused salvestatakse arvutisse, kus toimub andmete analüüs.

Uuringu vastunäidustused

- Silmaoperatsioon viimase 3 kuu jooksul
- Kõrvaoperatsioon viimase 6 kuu jooksul
- Kõrvapõletik
- Kuulmekäik on vaiguga blokeeritud
- Vanus alla 7 aasta

Uuringuks ettevalmistus

- 48 tundi enne uuringut ei tohi tarvitada järgmisi ravimeid: beetahistiin (nt Betaserc, Vertimed), tsinnarisiin (Stugeron), pentoksüfülliin (Trental), vinpotsetiin (Cavinton), homöopaatiline preparaat Vertigoheel, unerohud, rahustid, antidepressandid, antihistamiinikumid, antiepileptikumid.
- 48 tundi enne uuringut ei tohi tarvitada alkoholi.
- 4 tundi enne uuringut ei tohi süüa. Uuringuga võib kaasneda iiveldus.
- Igapäevaselt kasutatavad astma-, diabeedi-, südame- ja veresoonkonnaravimid võtke tavalises annuses ja kellaajal. Ravimid, mida Te kasutate vajadusel, võtke palun kaasa.
- Kui Teil on pikad juuksed, pange juuksed patsi.
- Eemaldage enne uuringut ripsetušš ja kunstripsmed.
- Eemaldage kõrvarõngad.
- Kontaktläätsed ei sega uuringu teostamist.

Uuringu teostamine

- Uuringu kestus on 60–70 minutit.
- Uuringu ajal võite tunda pearinglust ja ebamugavustunnet. Teavitage sellest koheselt uuringu tegijat.
- Uuringu teostamiseks on vajalik kuulmekäiku pritsida 30°C ja 44°C vett (kuulmekile perforatsiooni korral kasutatakse õhku).
- Pärast uuringut ei ole soovitatav samal päeval autot juhtida, sest võib esineda nõrkustunnet ja pearinglust.

Võimalikud tüsistused

- Iiveldus
- Nõrkustunne
- Kestev pearinglus

Uuringu tulemused

Uuringu tulemuste kohta annab arst vastuse samal päeval pärast uuringut.