

Tähis	VNA-55
Viide	
Versioon	01

## ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ И ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ВВЕДЕНИЕ ВИТАМИНА "К" НОВОРОЖДЕННОМУ

Введение витамина К необходимо всем новорожденным. Витамин К необходим для свертывания крови, его дефицит может вызвать опасные для жизни кровотечения.

Новорожденные имеют относительный дефицит витамина К при рождении, потому что витамин К не проникает через плацентарный барьер. Также количество витамина К в грудном молоке матери невелико, а количество бактерий в пищеварительном тракте новорожденного недостаточно для синтеза необходимого количества витамина.

Без введения витамина К у новорожденных может развиться недостаточность витамина К уже в первые дни жизни или в грудном возрасте. Это может привести к редкому, но опасному для жизни состоянию, называемому геморрагия из-за дефицита витамина К (KVDH), и в этом случае новорожденные подвергаются риску кровоизлияния в мозг.

KVDH можно предотвратить, давая новорожденным профилактический витамин К с рождения. Примерно к шестому месяцу жизни организм малышей имеет необходимый запас витамина К.

## Как вводят витамин К?

Самым простым и надежным способом введения витамина К является однократная внутримышечная инъекция сразу после рождения, этот метод используется в Эстонии с 1990 года. Инъекция обеспечивает защиту от KVDH на несколько месяцев.

- Витамин К вводится в мышцу бедра ребенку до двухчасового возраста.
- Место инъекции может быть заметно в течение нескольких дней после инъекции.

Витамин K также можно вводить перорально. Для обеспечения достаточной защиты необходимо ежемесячное введение витамина K, пока ребенку не исполнится семь месяцев. Однако при пероральном приеме витамин K может не усваиваться полностью и его действие кратковременно.

На основании исчерпывающей информации, полученной от SA Tartu Ülikooli Kliinikum даю согласие на введение моему ребенку витамина К однократной внутримышечной инъекцией.

(имя родителя,	подпись, дата)			
	исчерпывающей казываюсь от одн у.			

(имя родителя, подпись, дата)