

Tähis	VNA-56
Viide	
Versioon	01

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК И ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ВВЕДЕНИЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПРИВИВКИ НОВОРОЖДЕННОМУ

Противотуберкулезная вакцина БЦЖ (*Bacillus Calmette Guerin*)— живая ослабленная вакцина, создающая в организме иммунитет против микобактерий туберкулеза — возбудителя туберкулеза.

Вакцина защищает новорожденных и детей раннего возраста от тяжелых форм туберкулеза, таких как туберкулезный менингит и генерализованный туберкулез.

В Эстонии все здоровые новорожденные вакцинируются на 1 ый- 5 ый день жизни. Вакцинация бесплатная.

Вакцину вводит акушерка или медсестра, имеющая свидетельство о проведении прививок.

- Инъекцию вакцины делают в верхнюю треть левого плеча ребенка.
- Через 2-4 недели после вакцинации в месте инъекции может образоваться плотный узелок, кожа может иметь покраснение и блеск.
- Примерно через 6 недель на месте инъекции может выделяться несколько капель выделений, содержащих бактерии БЦЖ, что в целом безопасно для окружающих здоровых людей.
- В течение нескольких недель из раны может просачиваться тканевая жидкость.
- В случае выделения рану можно закрыть стерильной повязкой.
- На месте прививки может остаться небольшой шрам.

На основании исчерпывающей информации, полученной от SA Tartu Ülikooli Kliinikum, я даю свое согласие на введение противотуберкулезной вакцины моему ребенку.

(имя родителя, подпись, дата)

На основании исчерпывающей информации, полученной от SA Tartu Ülikooli Kliinikum, я отказываюсь делать своему ребенку противотуберкулезную вакцину.

(имя родителя, подпись, дата)