

Перевод: сестра отделения абдоминальной хирургии Инга Лепп

**ПЕРЕВЯЗЫВАНИЕ
ГЕМОРРОЯ**

Геморрой – что это?

Геморрой – увеличение геморроидальных узлов, т.е расширение (варикозное) вен заднего прохода и прямой кишки. Геморроидальные узлы могут быть причиной болевых ощущений, вызывать зуд, кровоточить. Если у Вас геморрой, возможно возникновение тромбов в геморроидальных узлах.

Методы лечения геморроя

Перевязка геморроя - это процедура, во время которой врач помещает тугую повязку на возникший в области заднего прохода геморроидальный узел, вызывая тем его усыхание.

Альтернативные методы лечения:

- заморозка геморроя, электролечение, лазерное прогревание, лечение инфракрасным излучением;
- хирургическое удаление;
- использование обезболивающих средств и применение сидячих ванн;
- отказ от лечения геморроя по состоянию здоровья.

Проконсультируйтесь с врачом для определения наиболее приемлемого для Вас метода лечения.

Процедура перевязки геморроя

Для уменьшения боли вызываемой процедурой можете попросить местное обезболивание. Местная анестезия обезболит определённый участок вашего тела, сами Вы в это время будете бодрствовать.

Для исследования анального канала врач использует анускоп. Во время процедуры доктор наложит на образовавшийся в канале заднего прохода геморроидальный узел тугую повязку, в результате чего геморрой иссохнет и отпадёт.

Послепроцедурный период

В течение 2-3 недель воздержитесь от поднятия тяжестей и высоких нагрузок. К работе можете приступить через 1-2 дня после процедуры, в зависимости выбранного метода лечения.

В течение нескольких дней после процедуры могут сохраняться трудности мочеиспускания и контроля газов кишечника. Неприятные ощущения всё – таки незначительные. Доктор посоветует подходящие Вам обезболивающие средства.

Обязательно поинтересуйтесь у доктора, что вы должны делать после процедуры и когда придти на приём. Может случиться, что Вам необходимы повторные процедуры.

Возможные осложнения и риски

- Местная анестезия не полностью обезболит нужный участок тела и Вы можете ощущать боль.
- В редких случаях возможны аллергические реакции на лекарственные препараты анестезии.
- Проблемы с мочеиспусканием.
- Возникновения воспалительного процесса в области заднего прохода.
- Геморрой может появиться вновь.
- Возникновение кровоточивости из заднего прохода.

Поинтересуйтесь у доктора, что необходимо предпринять при возникновении вышеперечисленных симптомов.

Сразу позвоните врачу, если:

- возникнет обильная кровоточивость;
- повысится температура тела;
- болезненные ощущения очень сильные;
- возникли проблемы с мочеиспусканием или опустошением кишечника.