

Составитель: сестра урологического кабинета Анжела Ременцова
2012

BCG-medac
внутрипузырное лечение

BCG-medac - это препарат для внутреннего лечения мочевого пузыря. Используется как иммуностимулирующий препарат для лечения злокачественной опухоли мочевого пузыря. Лечение начинают, когда после удаления опухоли прошло не менее 2-х недель.

Противопоказания

- Инфекция мочевых путей,
- повреждения слизистой оболочки мочевого канала,
- врожденный или приобретенный дефицит иммунитета (например ВИЧ),
- туберкулез,
- после облучения,
- кормление грудью,
- беременность.

Рекомендации перед процедурой

Пожалуйста, проинформируйте врача если у Вас:

- повышенная температура;
- болезненные ощущения внизу живота;
- частое и болезненное мочеиспускание;
- недержание мочи;
- аллергия на обезболивающие средства.

Нельзя употреблять жидкость за 4 часа до и 2 часа после процедуры. Перед BCG процедурой необходимо опорожнить мочевой пузырь.

Проведение процедуры

- Во время процедуры пациент находится на гинекологическом кресле.
- Гениталии обрабатывают антисептическим средством.

- В мочевой канал вводят лидокаиновый гель для обезболивания;
- Препарат (BCG-medac) вводят в мочевой канал при помощи катетера.
- Препарат должен оставаться в мочевом пузыре 2 часа.

Рекомендации после процедуры

Необходимо, чтобы препарат в течении 2-х часов по возможности обширнее соприкасался со слизистой оболочкой мочевого пузыря. В связи с этим, после процедуры необходимо лежать и каждые 15 минут переворачиваться то на живот, то на спину, то на бок. Через 2 часа после процедуры необходимо опорожнить мочевой пузырь, желательно в сидячем положении.

Если нет противопоказаний, в течении 48 часов после процедуры рекомендуется употреблять больше жидкости, чтобы способствовать выделению мочи. Употреблять жидкость начинать не ранее, чем через 2 часа после процедуры.

Возможные осложнения

- Температуры более 38°С,
- частое и болезненное мочеиспускание,
- кровь в моче.

Если у Вас возникнут такие жалобы, пожалуйста свяжитесь с врачом проводящим эту процедуру или со своим семейным врачом. Также можно обратиться за помощью в отделение экстренной медицины (ЕМО) по адресу Пуусепа 8.

Телефонный номер урологического кабинета: 7319 462