

Очень редким осложнением является травма мочевого пузыря или мочевого канала, повышенная температура и озноб.

Рекомендации после обследования

- После обследования Вы можете продолжить свой день в обычном для Вас режиме.
- Неприятные ощущения (кровь в моче, частое и болезненное мочеиспускание и т.д), которые могут возникнуть после обследования, обычно проходят в течение 24-48 часов.
- В течение первых суток советуется употреблять больше жидкости (1,5-2 литра), чтобы уменьшить вышеуказанные симптомы, а также ускорить их исчезновение.
- Избегайте переохлаждения.

Пожалуйста, свяжитесь с семейным врачом или с врачом, который проводил обследование, если у вас наблюдаются следующие жалобы

- Моча остаётся красной или в моче есть кровяные сгустки после нескольких мочеиспусканий;
- Вы не можете мочиться в течение 8 часов после процедуры;
- повысилась температура, чувствуете озноб и острую боль в животе или в боку;
- появились признаки инфекции уротракта: боль или жжение при мочеиспускании; частые позывы к мочеиспусканию; моча красная, мутная или имеет неприятный запах; боль или чувство тяжести внизу живота.

Телефонный номер урологического кабинета: 7319-462 (Пн-Пт 9.00-15.00)

Также можете обратиться за помощью в отделение экстренной медицины по адресу Л.Пуусепа 8.

Составитель: сестра урологического кабинета
Анжела Ременцова

Цистоскопическое обследование

Цистоскопия – это эндоскопическое обследование мочевого пузыря и мочевого канала, с помощью специального инструмента, называемого цистоскопом.

Показания для цистоскопического обследования

- Диагностика болезней мочевого канала и мочевого пузыря;
- оценка эффективности лечения;
- удаление инородного тела;
- подозрение на раковую опухоль;
- гематурия (кровь в моче).

Цистоскопия позволяет не только обнаружить опухоль внутри мочевого пузыря, но и при необходимости взять пробу (биопсию) для микроскопического исследования.

Противопоказания для цистоскопии

- Острое воспаление уротракта;
- травма мочевого канала;
- выраженное сужение мочевого канала.

Рекомендации перед обследованием:

Пожалуйста, проинформируйте врача, если:

- у Вас аллергия на обезболивающие средства (например, когда-то уже была реакция на лидокаин или обезболивающее средство, которое использовал зубной врач);
 - Вы используете аспирин или другие разжижающие кровь лекарства.
- Перед исследованием нет необходимости ограничивать приём пищи или жидкости (не считая случаи, когда цистоскопию необходимо проводить под общим наркозом).

Проведение цистоскопии

- Чаще всего обследование мочевого пузыря проводится амбулаторно, под местным обезболиванием (гелевое обезболивание).
- Во время обследования пациент находится на гинекологическом кресле.
- Гениталии обрабатывают антисептическим средством и покрывают специальной стерильной салфеткой.
- В мочевой канал вводят 2% лидокаиновый гель.
- Цистоскоп через мочевой канал осторожно вводят в мочевой пузырь.

- Мочевой пузырь наполняют стерильной жидкостью, что растягивает пузырь и позволяет врачу обследовать всю внутреннюю стенку пузыря.
- Если на слизистой оболочке мочевого пузыря есть какие-то изменения, то показана биопсия.
- После того, как обследована слизистая оболочка мочевого пузыря и мочевого канала, жидкость из пузыря выпускают, и инструмент осторожно удаляют.
- Во время введения цистоскопа в мочевой пузырь и на протяжении всей процедуры пациента просят спокойно и глубоко дышать, а также расслабиться и не делать резких движений.

Расслабление мышц живота и нижней части тела, глубокое и спокойное дыхание помогут пациенту легче перенести обследование и избежать травм слизистой оболочки мочевого канала и мочевого пузыря.

- Обследование длится 5-15 минут, вместе с подготовкой – полчаса.
- Результаты обследования врач сообщает во время процедуры или сразу после неё.

Возможные осложнения

Обычно цистоскопия довольно легко переносится пациентом и риск осложнений минимальный.

- Может возникнуть неприятное ощущение во время введения цистоскопа через мочевой канал.
- Неприятное ощущение и позывы к мочеиспусканию могут возникнуть во время наполнения мочевого пузыря жидкостью.
- Мужчинам переносить это обследование труднее, чем женщинам (мочевой канал длиннее, чем у женщин).
- Если у мужчины увеличена предстательная железа, то может быть затруднено введение цистоскопа.
- После обследования в моче может быть небольшое количество крови.
- После обследования мочеиспускание может быть немного болезненным.

Наиболее частые осложнения

- Гематурия (кровь в моче);
- частое и болезненное мочеиспускание;
- отёк мочевого канала;
- инфекция уротракта.