



Hüpertoonilised silmatilgad

Hüpertoonilised silmatilgad

Sodium Chloride 5,85% Braun on kontsentreeritud naatriumkloriidi lahus. Seda infusioonikontsentraati kasutatakse soolade asendamiseks veenisisese tilga kujul. Sama lahust on võimalik kasutada lahjendamata kujul hüpertooniliste silmatilkadena kroonilise sarvkesta turse vähendamiseks, parandades seeläbi nägemisteravust ja soodustades sarvkesta pinna paranemist, korduva erosiooni sündroomi korral. Karp sisaldab 20 plastikust ampulli steriilse 5,85% naatriumkloriidi lahusega.

Silmatilkade kasutamine:

- Enne ravimi panemist silma peske kindlasti korralikult käed.
- Murdke ampull teiste küljest ära, seejärel eemaldada keerates kork. Lahust on võimalik otse ampullist silma tilgutada.
- Kallutage pea taha ja tõmmake alalaug alla.
- Hoidke pudelit otse silma kohal. Vaadake üles ning pigiste üks tilk ravimit lausoppi. Kui silma sattub rohkem kui üks tilk, siis see ei ole kahjulik, üleliigne ravim voolab silmast välja. Et ära hoida ravimi saastumist haigustekitajaga, ärge puudutage ravimipudeli otsaga silma, ripsmeid ja laugusid.

- Pärast ravimi tilgutamist sulgege silmad paariks minutiks ning suruge õrnalt sõrmega silma sisenuka, et vältida ravimi äravoolu ninapisarakanalisse. Ärge hõõruge silma!
- Tilgad võivad vahetult pärast tilgutamist põhjustada lühiajalist kipitust, mis on tingitud suurest soola kontsentratsioonist.
- Avatud ampulli võib kasutada kahe ööpäeva jooksul, et vältida lahuse saastumist. Pärast avamist ning tilgutamiskordade vahepeal tuleb avatud ampulli säilitada külmkapis +4°C kraadi juures.
- Manustamiskordade arv sõltub silma seisundist ja selle määrab teie raviarst, kui raviarst ei ole teisiti määranud siis kasutatakse tilkasid 3 korda päevas.

Koostanud: dr Mikk Pauklin