

21-hüdroksülaasi vastane IgG (S-21OH IgG)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab synlab Eesti labor, tel. 17123

21-hüdroksülaas on ensüüm, mis osaleb neerupealistes steroidhormoonide aldosterooni ja kortisooli biosünteesis. Neerupealiste autoimmuunse destruktsioon on primaarse neerupealiste puudulikkuse üks tavalisemaid põhjusi. Põhiliseks antigeeniks sel puhul on neerupealiste spetsiifiline ensüüm 21-hüdroksülaas ja seetõttu on 21-hüdroksülaasi vastased antikehad tähtsaks markeriks neerupealiste autoimmuunse haiguse diagnoosimisel.

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsuti	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)
Säilivus	Seerum -20 °C pikemat aega

Transport toimub tööpäeviti synlab Eesti autoga.

Referentsväärtused

Kõik vanusegrupid	< 10
-------------------	------

Näidustus ja kliiniline tähendus

21-hüdroksülaasi vastaseid antikehi määratakse neerupealiste autoimmuunse destruktsiooni kahtluse korral.

Antikehad võivad ilmned juba enne kliinilise pildi väljakujunemist. Analüüsi on soovitatav teha neerupealiste puudulikkuse ja kõikide polüglandulaarsete autoimmuunsete sündroomide korral.