

Peitveri roojas (hemoglobiin, kvantitatiivne) (St-Hb QN)

Kliinilise keemia ja laboratoorse hematoloogia osakond

Normaalselt võib erituda seedetraktist väljaheitesse 0,5–1 mL verd ööpäevas. Vere hulga suurenemine esineb mitmesuguste gastrointestinaaltrakti haiguste puhul.

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Proovinõu	Roojatops
Säilivus	Toatemperatuuril kuni viis päeva, +4 °C kuni seitse päeva

Analüüsi tegemise aeg: ööpäevaringselt

Analüüsimeetod: immuunturbidimeetria

Referentsväärtus

Kõik vanusegrupid	< 15 µg/g
-------------------	-----------

Tulemus väljastatakse koos tõlgendusega: < 15 µg/g negatiivne, ≥ 15 µg/g positiivne.

Jämesoolevähi riikliku sõeluuringu otsustuspiir on < 20 µg/g negatiivne, ≥ 20 µg/g positiivne.

Näidustus ja kliiniline tähendus

Seedetrakti verejooksu avastamine, sõeluuring riskigrupi haigetel (jämesoole- ja pärasoole vähk).

Seedetrakti verejooksu põhjuseks võivad olla mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandid, seedetrakti kasvajad, põletikud, polüübid, divertiiklid, haavandiline koliit, seedetrakti veenilaiendid, traumad, hemangioomid.

Tiit Salum/Katrin Reimand

Muudetud 06.03.2020