

Vankomütsiinresistentse enterokoki (VRE) kandluse uuring

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab **Ida-Tallinna Keskhaigla labor**, tel. 606 7795

Terminiga "vankomütsiinresistentne enterokokk" (VRE) tähistatakse enterokokkide tüvesid, mis on muutunud resistentseks vankomütsiini suhtes, ning on potentsiaalsed hospitaalinfektsiooni tekitajad. Tähtsaimaks nakkusallikaks haiglatingimustes on VRE-ga koloniseeritud või infitseeritud patsient. VRE võib koloniseerida terveid inimesi, kelle käte kaudu nakkus levib. Seetõttu nõutakse mõnes haiglas tööloa saamiseks VRE puudumist kinnitavat tõendit.

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Proovinõu	Roojatops või transprodisöötmega katsuti
Säilivus	Roe +4 °C üks päev

Analüüsiks sobib värske väljaheide.

Analüüsi tegemise aeg: tööpäeviti

Analüüsimeetod: külv selektiivsele agarile, samastamine ja vankomütsiini minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine.

Lõplik vastus: negatiivne 3.–4. päeval, positiivne 3.–5. päeval.

Näidustus ja kliiniline tähendus

VRE puudumist kinnitava tõendi väljastamine.

Väljastatakse VRE puudumist või olemasolu kinnitav tõend.

Krista Lõivukene