

Veritsusaeg (Pt-Ivy)

Laboratoorse hematoloogia ja üldkliiniliste analüüside osakond, tel. 731 8315
Lastekliiniku osakond, tel. 731 9591

Veritsusaeg peegeldab trombotsüütide funktsiooni- ja veresoone vasokonstriksioonivõimet. See on aeg, mis kulub veritsuse lakkamiseks väikestest pindmistest haavadest. Veritsusaeg on hemostaasi kõige halvemini standardiseeritav test, mille sensitiivsus ja spetsiifilisus on väikesed.

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Üks nädal enne uuringu teostamist tuleks võimalusel vältida mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite tarvitamist. Ivy meetodit ei soovitata kasutada patsientidel, kellel on kalduvus tugevale armkoe tekkele ja väikelastel, kelle puhul on raskusi uuringu läbiviimisel. Uuringu teostab laborant.

Analüüsi tegemise aeg: ööpäevaringselt

Analüüsimeetod: modifitseeritud Ivy meetod (mõõdetakse veritsusaeg standardiseeritud suurusega nahalõikest standardiseeritud venoosse staasi tingimustes).

Referentsväärtused

≥ 18 a	< 8 min
-------------	---------

Näidustus ja kliiniline tähendus

Primaarse hemostaasi häirete diagnostika.

Veritsusaeg on pikenenud trombotsütopeeniate, trombotsüütide funktsioonihäirete, von Willebrandi tõve ja veresoonesena raskekujuliste kahjustuste korral. Veritsusaega üle 15 minuti peetakse väljendunud patoloogiaks.

Atsetüülsalitsüülhape, mittesteroidsed põletikuvastased ravimid jt trombotsüütide funktsiooni mõjutavad ravimid võivad pikendada veritsusaega, paratsetamool ei pikenda.

Vt ka: Trombotsüütide funktsiooni uuring

Evi-Virve Rajasaar