

LIIKVORI ANALÜÜSIDE TELLIMISLEHT

Patsiendi PERENIMI **EESNIMI**
Isikukood (või sugu ja vanus) **Proovivõtu kuupäev**
Tellija (nimi, kood) **Proovivõtu kellaaeg**
Tellija telefon **Proovivõtja (nimi, kood)**
Asutus, osakond

2 mL liikvorit lisandita katsutis (värvitu või valge musta rõngaga kork)

<input type="checkbox"/> Liikvori tsütogramm analüsaatoril	<input type="checkbox"/> Valk liikvoris
<input type="checkbox"/> Liikvori- ja seerumi glükoosi suhe*	<input type="checkbox"/> Liikvori- ja seerumi albumiini suhe*
<input type="checkbox"/> Laktaat liikvoris	<input type="checkbox"/> IgG indeks*
	<input type="checkbox"/> Oligoklonaalne IgG liikvoris*

* Koos liikvoriga tuleb saata laborisse samaaegselt võetud vereproov! Vereproov tuleb võtta geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsutisse (punane kollase rõngaga või kollane kork).

2 mL liikvorit lisandita katsutis (värvitu või valge musta rõngaga kork) VÕTTA ERALDI KATSUTISSE!

<input type="checkbox"/> Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel liikvoris	<i>E coli K1, H influenzae, L monocytogenes, N meningitidis, S agalactiae, S pneumoniae, M pneumoniae, S pyogenes, HSV1, HSV2, HHV6, Enterovirus, Parechovirus, VZV, C neoformans/ C gattii</i>
<input type="checkbox"/> Polüoomiviirus BK DNA QN	<input type="checkbox"/> CMV DNA QN
<input type="checkbox"/> Polüoomiviirus JC DNA QN	<input type="checkbox"/> EBV DNA QN
<input type="checkbox"/> Adenoviiruse DNA QN	
<input type="checkbox"/> Toxoplasma gondii DNA	

<input type="checkbox"/> HSV1,2 IgG indeks** <i>HSV1,2 IgG QN liikvoris</i>	<input type="checkbox"/> TBEV IgM liikvoris
<input type="checkbox"/> VZV IgG indeks** <i>VZV IgG QN liikvoris</i>	<input type="checkbox"/> TBEV IgG indeks** <i>TBEV IgG liikvoris</i>
<input type="checkbox"/> T pallidum IgG indeks** <i>T pallidum IgG liikvoris</i>	<input type="checkbox"/> B burgdorferi IgM liikvoris
	<input type="checkbox"/> B burgdorferi IgG indeks** <i>B burgdorferi IgG liikvoris</i>

** Koos liikvoriga tuleb saata laborisse samaaegselt võetud vereproov! Vereproov tuleb võtta geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsutisse (punane kollase rõngaga või kollane kork). Patogeeni indeksi jaoks peab olema tellitud albumiini ja IgG analüüsid nii liikvorist kui ka seerumist.